

## Mover a las Vacas

Cuando mueva a las vacas hágalo con amabilidad y tranquilidad. La liberación de la leche puede verse afectada si las vacas son lastimadas, asustadas o apuradas.  
¡Esté atento y notifique las vacas enfermas!



## Usar Guantes

Las manos limpias, secas y sanas reducen la propagación de las bacterias que causan la mastitis.  
Utilice guantes de nitrilo o látex para reducir la superficie donde las bacterias pueden alojarse.



## Despuntar

Detecte signos de mastitis, revisar los 2 o 3 primeros chorros de leche en tazón de fondo oscuro.  
Hágalo con delicadeza y asegúrese de que cada cuarto esté en buen estado.



## Presellar

Utilice desinfectante, espuma o pulverizador.  
Cubra toda la ubre con desinfectante. El presellado debe estar en contacto con la ubre entre 20 a 30 segundos.



## Limpiar y Secar

Retire suavemente materia orgánica y tierra, desinfecte con movimientos circulares hacia abajo.  
De la vuelta a la toalla para secar los extremos de los pezones.



## Colocar las Unidades de Ordeño

Al colocar las unidades entre 60 a 120 segundos después de la primera estimulación se optimizará el tiempo de liberación de leche.  
Asegúrese de que las pezoneras estén alineadas directamente con la base de la ubre.



## Sellar

Cubrir cada pezón con un sellador de alta calidad, esto promueve la disminución del crecimiento bacteriano al formar una película protectora sobre el pezón, mejorando así la condición de la piel y sellando la punta del pezón.



Para obtener mayor información contacte a su representante comercial local.