



STOP ZAUSTAVITE TOPLINSKI STRES



TELAD

ZNAKOVI TOPLINSKOG STRESA

- Veća brzina disanja od normalne (24–36 udisaja/min)
- Disanje otvorenim ustima
- Dehidracija
- Gubitak apetita
- Tjelesna temperatura teladi $>39,5^{\circ}\text{C}$
- Smanjeno kretanje
- Produljeno stajanje, manje ležanja
- Smanjen unos mlijeka
- Smanjen unos žitarica kod startera
- Povećan unos vode
- Povećan morbiditet i smrtnost
- Slabije dobivanje na težini zbog smanjenog unosa žitarica i povećanih potreba za održavanjem tijela

NASTAMBA I OKOLIŠ

- Osigurati hladno, zasjenjeno i ventilirano mjesto za odmor teladi
- Nastambe od pleksiglasa/plastični iglui mogu postati saune, stelja od slame može zadržavati toplinu
- Pijesak, piljevina (strugotine drveta) ili rižine ljske mogu biti bolji izbor
- Veliki komadi tkanine mogu osigurati hlad kako bi se smanjilo sunčev zračenje
- Blokirati najmanje 80 % ultraljubičastog zračenja
- Dobri su visoki krovovi koji omogućuju dobro prozračivanje
- Podignuti plastične nastambe s poda kako bi se povećala cirkulacija zraka
- Osigurati dovoljno prostora oko pojedinačnih nastambu radi cirkulacije zraka
- Smanjiti broj teladi u skupinama i osigurajte da se svi mogu odmoriti u hladu

HRANIDBA I NUTRITIVNA RJEŠENJA

- Osigurati opskrbu kvalitetnom vodom i žitaricama
- Osigurati da telad konzumira svo mlijeko i ponuditi im elektrolite u 12:00 sati
- Hidratacija je ključna
- Omogućiti pristup vodi i hrani u hladu
- Povećati količinu hrane koja se daje ujutro
- Odgoditi popodnevno hranjenje za navečer
- Koristiti Bio-Mos® ili Actigen® za bolji rad crijeva teladi tijekom razdoblja povećanog stresa